

PROFESSIONAL INFORMATION

SCHEDULING STATUS: **S0**

Category D: Complementary medicine.

Discipline: Health Supplement

34.12 Multiple substance formulation

PROPRIETARY NAME, STRENGTH, PHARMACEUTICAL FORM –

TRANCOR®, 60 & 120 Capsules

COMPOSITION

Each one (1) capsule of TRANCOR® contains the following actives:

Taurine	500 mg
L-Cysteine (as N-acetyl-L-cysteine)	300 mg
Magnesium (as Magnesium Malate)	100 mg
Decaffeinated Green Tea (Camellia sinensis) [Leaf]	150 mg
(Extract 25:1 ratio standardized to 60% (90 mg) catechins and 40%) (60 mg) epigallocatechin gallate (EGCG))	
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)	12,5 mg

Inactive Ingredients: Capsule (hydroxypropylmethylcellulose), magnesium stearate (vegetable), microcrystalline cellulose and silica.

This product is suitable for Vegetarians and non-GMO. (Sugar Free)

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION

Complementary Medicine

INDICATION & PHARMACOLOGICAL ACTION

TRANCOR® is formulated to support a sense of calmness. This advanced formula features ingredients that cross the blood-brain barrier for targeted neurological support.

Ingredients	Uses for ingredient
Taurine	Taurine can help reduce anxiety by inhibiting glutamate, an excitatory neurotransmitter. It can also help treat addiction by modulating dopamine
L-Cysteine (as N-acetyl-L-cysteine)	By helping replenish the antioxidant glutathione and regulate glutamate, NAC has the potential to treat conditions such as Alzheimer's disease and Parkinson's disease.
Magnesium (as Magnesium Malate)	Magnesium malate and threonine have also demonstrated therapeutic effects and may be useful in many psychiatric cases.
Decaffeinated Green Tea (Camellia sinensis)	It's rich in bioactive compounds, such as catechins, L-theanine, and caffeine, and studies have linked it to multiple beneficial effects. It may also boost your immune system, reduce stress and anxiety, and promote weight loss.
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)	B6 helps produce calming neurotransmitters, including serotonin and GABA. These neurotransmitters can help us feel more stable and less overwhelmed in the face of trauma or day-to-day stressors.

CONTRA INDICATIONS:

If you are taking any chronic medication, do not use this product without consulting your healthcare professional. Do not take TRANCOR® if you are hypersensitive (allergic) to any of the ingredients. If you have allergies, be sure to check with your healthcare professional before taking this supplement. **Surgery:** TRANCOR® might slow blood clotting. This might increase the risk of bleeding during and after surgery. Stop taking TRANCOR® at least 2 weeks before a scheduled surgery.

WARNING AND SPECIAL PRECAUTIONS

Should you have any of the following diagnosed conditions, consult with your healthcare professional before use: Asthma, Bleeding disorders, Anemia, Heart conditions, Diabetes, Glaucoma, High blood pressure, Irritable bowel syndrome (IBS), Liver disease, Weak bones (osteoporosis), Post-surgical stent placement, Weight loss surgery. If you are taking the following medication, please consult with your healthcare practitioner before taking: Lithium, Medications for high blood pressure (Antihypertensive drugs), Nitroglycerin, Activated charcoal, Chloroquine (Aralen), Medications for high blood pressure (Antihypertensive drugs), Medications that slow blood clotting (Anticoagulant / Antiplatelet drugs), Ephedrine, Atorvastatin (Lipitor), Medications that can harm the liver (Hepatotoxic drugs), Warfarin (Coumadin), Phenytoin (Dilantin), Levodopa. If any of the following happens, stop using TRANCOR® and tell your doctor or go to the casualty department at your nearest hospital:

- Allergic reactions— rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing;



These are all very serious effects. If you have them, you may have had a serious reaction to TRANCOR®. You may need urgent medical attention or hospitalisation.

Side effects that usually do not require medical attention (report to your healthcare professional if they continue):

- nausea, stomach pain, loss of appetite.

These are all very serious effects. If you have them, you may have had a serious reaction to TRANCOR®. You may need urgent medical attention or hospitalisation.

Seek advice from a healthcare professional if you have any medical condition. Discontinue use immediately should any adverse reaction occur.

Read this leaflet carefully because it contains important information for you. This product is available without a doctor's prescription.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share medication with any other person.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- You must consult a doctor should your condition worsen or does not improve.

DO NOT USE THIS PRODUCT:

- If you are hypersensitive (allergic) to any of the ingredients listed.
- Do not accept this package if seals are broken.

INTERACTIONS

Always tell your healthcare professional if you are taking any other medicine. It is possible that exposure of certain supplement ingredients may interfere with certain medications. (See **Warnings & Special precautions**)

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

Adults: Take two (2) capsules twice daily or as directed by your healthcare practitioner.

Do not take more than the recommended dose.

SIDE EFFECTS

Should your general health worsen, or if you experience any untoward effects while being exposed to this product, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

KNOWN SYMPTOMS OF OVER DOSAGE AND PARTICULARS OF ITS TREATMENT

See side-effects.

Treatment:

Discontinue use and consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

STORAGE INSTRUCTION

Store in a cool, dark place, below 25 °C.

Protect from direct sunlight and heat.

Store in the original bottle.

Keep the bottle tightly closed.

Replace the protective cap after each use.

Do not use after the expiry date stated on the bottle.

Do not use TRANCOR® if you notice visible signs of deterioration.

IDENTIFICATION

Clear vegetable capsule with tan speckled powder.

PRESENTATION

60 CAPSULES - A white 175 ml HDPE bottle with a white cap, induction seal, tamper shrink seal, wadding and silica gel sachet.

120 CAPSULES - A white 250 ml HDPE bottle with a white cap, induction seal, tamper shrink seal, wadding and silica gel sachet.

REGISTRATION NUMBER

To be allocated by SAHPRA upon registration.

This medicine has not been evaluated by SAHPRA for quality, safety, or intended use.

NAME AND BUSINESS ADDRESS OF APPLICANT

Distributed by:

Amipro Advanced Development Products (Pty) Ltd
Unit 3, Eastgate Business Park, 1 South Road, Eastgate Extension,
Sandton, 2146
Tel: 011-802-8101

DATE OF PUBLICATION

To be allocated by the regulatory authority.

PROFESIONELE INLIGTINGSBLAD

SKEDULERINGSSTATUS: **S0**

Kategorie D: Komplementêre medisyne.

Dissipline: Gesondheidsaanvulling

34.12 Meervoudige Bestanddeel Formulasie

HANDELSNAAM EN DOSEERVORM,

TRANCOR®, 60 & 120 Kapsule

SAMESTELING

Elke (1) kapsule TRANCOR® bevat die volgende aktiewe stowwe:

Taurine	500 mg
L-sisteien (as N-asetiel-L-sisteien)	300 mg
Magnesium (as magnesiummalaat)	100 mg
Kafeienvrye groen tee (Camellia sinensis) [blaar]	150 mg

(Uittreksel 25: 1 verhouding gestandaardiseer tot 60% (90 mg) katekiene en 40%) (60 mg) epigallocatechin gallate (EGCG)

Vitamiën B6 (as piridoksien HCl)	12,5 mg
----------------------------------	---------

Onaktiewe bestanddele: Kapsule (hidroksiopropylmetiellsullose), magnesiumstearaat (groente), mikrokrystaliese sellulose en silika.

Hierdie produk is geskik vir vegetêriërs en nie-GGO. (Suikervry)

FARMAKOLOGIESE KLASIFIKASIE

Komplementêre medisyne

AANDUIDING EN FARMAKOLOGIESE WERKING

TRANCOR® is geformuleer om 'n gevoel van kalmté te ondersteun. Hierdie gevorderde formule bevat bestanddele wat die bloedreïnersperring oortreek vir getelkende neurologiese ondersteuning.

Dit is alles baie ernstige gevolge. As jy dit het, het jy dalk 'n ernstige reaksie op **TRANCOR®** gehad. Jy sal dalk dringende mediese hulp of hospitalisasie nodig hê.

Nuwe-effekte wat gewoonlik nie mediese hulp benodig nie (rapporteer aan jou gesondheidsorgpraktisyn as hulle voortduur):

- naarheid, maagpyn, verlies aan eetlus, hoofpyn.

Dit is alles baie ernstige gevolge. As u dit het, het u moontlik 'n ernstige reaksie op **TRANCOR®** gehad. Miskien het u dringende mediese hulp of hospitalisasie nodig.

Raadpleeg 'n gesondheidsorgpraktisyn as u enige mediese toestand het.

Lees hierdie inligtingsblad aandagtig deur, want dit bevat belangrike inligting vir u. Hierdie produk is beskikbaar sonder doktersvoorskrif.

- Hou hierdie inligtingsblad. Miskien moet u dit weer lees.

- Moenie medisyne met enige ander persoon deel nie.

- Vra jou apteker of jy meer inligting of advies benodig.

- Jy moet 'n dokter raadpleeg indien jou toestand vererger of nie verbeter nie.

MOENIE HIERDIE PRODUK GEBRUIK NIE:

- As jy hipersensitief (allergies) is vir enige van die bestanddele wat gelys word.

- Jy moet nie hierdie produk aanvaar as seëls gebreek word nie.

INTERAKSIES

Vertel altyd jou gesondheidsorgpraktisyn as jy enige ander medisyne gebruik. Dit is moontlik dat blootstelling van sekere

aanvullingsbestanddele met sekere medisyne 'n interaksie mag hê. (Sien **Waarskuwings en Spesiale Voorsorgmaatreëls**)

DOSES EN AANWYSINGS VIR GEBRUIK

Volwassenes: Neem twee (2) kapsules twee keer per dag of soos voorgeskryf deur jou gesondheidspraktisyn.

Moenie meer as die aanbevole dosis neem nie.

NUWE-EFFEKTE

Indien jou algemene gesondheid vererger of as jy enige nadelige

effekte ervaar tydens die gebruik van hierdie medisyne, raadpleeg

asseblief jou dokter, apteker of ander gesondheidsorgpraktisyn vir

raad. As jy enige nuwe-effekte sien wat nie in hierdie inligtingsblad

genoem word nie, stel asseblief jou dokter, apteker of

gesondheidsorgpraktisyn in kennis.

BEKENDE SIMPTOME VAN OORDOSERING EN BESONDERHEDE VAN DIE BEHANDELING DAARVAN

Sien nuwe-effekte.

Behandeling:

Staa gebruik en raadpleeg jou dokter, apteker of ander

gesondheidsorgpraktisyn vir advies.

BEREKENDE SIMPTOME VAN OORDOSERING EN BESONDERHEDE VAN DIE BEHANDELING DAARVAN

Sien nuwe-effekte.

Behandeling:

Staa gebruik en raadpleeg jou dokter, apteker of ander

gesondheidsorgpraktisyn vir advies.

BEREKENDE INSTRUKSIE

Bêre in 'n koel, donker plek, onder 25 °C.

Beskerk teen direkte sonlig en hitte.

Bêre in die oorspronklike bottel.

Hou die bottel styf toe.

Vervang die beskermende dop na elke gebruik.

Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die bottel aangedui

word nie.

Moenie **TRANCOR®** gebruik as u sigbare tekens van agteruitgang

opmerk nie.

IDENTIFIKASIE

Duidelik groentekapsule met bruin gespikkelde poeier.

AANBIEDING

60 KAPSULES - 'n Wit 175 ml HDPE-bottel met 'n wit dop, induksiesêl,

peuterkrimpesêl, spons en silikagelsakkie.

120 TABLETTE - 'n Wit 250 ml HDPE-bottel met 'n wit dop,

induksiesêl, peuterkrimpesêl, spons en silikagelsakkie.

REGISTRASIE NOMMER

Om by registrasie deur SAHPRA toegeken te word.

Hierdie medisyne is nie deur SAHPRA geëvalueer vir kwaliteit,

veiligheid of beoogde gebruik nie.

NAAM EN BESIGHEIDSADES VAN APPLIKANT

Versprei deur: Amipro Advanced Development Products (Pty) Ltd

Unit 3, Eastgate Business Park, 1 South Road,

Eastgate Extension,

Sandton, 2146,

Tel: 011- 802-8101

DATUM VAN PUBLIKASIE

Om deur die regulerende owerheid toegeken te word.

Bestanddele	Gebruik vir bestanddeel
Taurine	Taurine kan help om angs te verminder deur glutamaat, 'n opwindende neurotransmitter, te inhibeer. Dit kan ook help om verslawing te behandel deur dopamien te moduleer
L-sisteien (as N-asetiel-L-sisteien)	Deur te help om die antioksidant glutathion aan te vul en glutamaat te reguleer, het NAC die potensiaal om toestande soos Alzheimer se siekte en Parkinson se siekte te behandel.
Magnesium (as magnesiummalaat)	Magnesiummalaat en treonien het ook terapeutiese effekte getoon en kan nuttig wees in baie psigiatriese gevalle.
Kafeienvrye groen tee (Camellia sinensis)	Dit is ryk aan bioaktiewe verbindings, soos katekiene, L-theanine en kafeien, en studies het dit gekoppel aan verskeie voordelige effekte. Dit kan ook jou immuunstelsel 'n hupstoot gee, stres en angs verminder en gewigsverlies bevorder.
Vitamiën B6 (as piridoksien HCl)	B6 help om kalmerende neurotransmitters te produseer, insluitend serotonien en GABA. Hierdie neurotransmitters kan ons help om meer stabiel en minder oorweldig te voel in die lig van trauma of daaglikse stressors.

KONTRA-INDIKASIES:

As jy enige chroniese medisyne neem, moenie hierdie produk gebruik sonder

om jou gesondheidsorgpraktisyn te raadpleeg nie. Moenie **TRANCOR®** neem as

jy hipersensitief (allergies) is vir enige van die bestanddele nie. As jy

allergieë het, maak seker dat jy met jou gesondheidsorgpraktisyn gaan

voordat jy hierdie aanvulling neem. **Chirurgie:** **TRANCOR®** kan bloedstolling

vertraag. Dit kan die risiko van bloeding tydens en na die operasie verhoog.

Hou op om **TRANCOR®** ten minste 2 weke voor 'n geskeduleerde operasie te

neem.

WAARSKUWING EN SPESIALE VOORSORGMAATREËLS

Indien jy enige van die volgende gediagnoseerde toestande het, raadpleeg jou

gesondheidsorgpraktisyn voor gebruik: Medisyne vir hoë bloeddruk

(antihertensiewe middels), asma, bloedingsversteurings, bloedarmoede,

harttoestande, diabetes, gloukoom, hoë bloeddruk, prikkelbare dermsindroom

(IBS), lewersiekte, swak bene (osteoporose), post-chirurgiese stentplasing,

gewigsverlieschirurgie.

As jy die volgende medisyne neem, raadpleeg asseblief jou

gesondheidspraktisyn voordat jy neem: Asma, bloedingsversteurings,

bloedarmoede, harttoestande, diabetes, gloukoom, hoë bloeddruk,

prikkelbare dermsindroom (IBS), lewersiekte, swak bene (osteoporose), post-

chirurgiese stentplasing, gewigsverlieschirurgie. As jy die volgende medisyne

neem, raadpleeg asseblief jou gesondheidspraktisyn voordat jy neem: Litium,

medisyne vir hoë bloeddruk (Antihertensiewe middels), Nitroglycerin,

Geaktiveerde houtskool, Chlorokien (Aralen), lewersiekte, medisyne vir hoë bloeddruk

(Antihertensiewe middels), medisyne wat bloedstolling vertraag

(Antikoagulant / Antiplaatjie-middels), Efedrien, Atorvastatin (Lipitor),

medisyne wat die lewer kan benadeel (Hepatotoksiese middels), Warfarin

(Coumadin), Fenitioien (Dilantin), Levodopa. As enige van die volgende

gebeur, hou op om **TRANCOR®** te gebruik en vertel jou dokter of gaan na die

ongevalle-afdeling by jou naaste hospitaal:

- Allergiese reaksies- uitslag, jeuk / swelling (veral van die gesig / tong / keel), erge duseligheid, probleme met asemhaling,;